

Vážená pacientka, vážený pacient,

Váš lekár Vás začal liečiť Pradaxou. Aby bolo užívanie Pradaxy bezpečné, venujte, prosím, pozornosť priloženým dôležitým informáciám. Keďže táto pohotovostná karta pacienta obsahuje dôležité informácie o Vašej liečbe, noste, prosím, túto kartu vždy pri sebe, aby ste mohli informovať odborný zdravotnícky personál o tom, že užívate Pradaxu.

Pradaxa[®]
dabigatranetexilát

The logo for Pradaxa consists of the brand name 'Pradaxa' in a bold, blue, italicized sans-serif font. Below it, the generic name 'dabigatranetexilát' is written in a smaller, blue, lowercase sans-serif font. To the right of the text is a red graphic element consisting of a thick, curved line that forms a partial circle, with a small white dot at its center.

Pradaxa Informácie pre pacientov

O vašej liečbe

- Pradaxa riedi krv, čím sa predchádza tvorbe nebezpečných krvných zrazenín.
- Pri užívaní Pradaxy sa riadte pokynmi svojho lekára. Nikdy nevynechajte dávku a neprestaňte užívať Pradaxu bez konzultácie so svojím lekárom.
- Informujte svojho lekára o všetkých aktuálne užívaných liekoch.
- Pred každým chirurgickým/invazívnym zákrokom informujte svojho lekára o užívaní Pradaxy.

- Pradaxa sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Kapsula sa má prehltnúť vcelku a zapiť pohárom vody. Kapsula sa nesmie lámať ani hrýzť a nesmú sa vyprázdňovať pelety z kapsuly.

Kedy požiadať o radu lekára

- Užívanie Pradaxy môže zvýšiť riziko krvácania. Ihneď sa obráťte na svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich možných prejavov a príznakov krvácania: opuch, diskomfort, neobvyklá bolesť alebo bolesť hlavy, závrat, bledosť, slabosť, nezvyčajné

modriny, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, neobvyklé dlhotrvajúce krvácanie po porezaní, abnormálne menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, krv v moči, ktorý môže byť ružový alebo hnedý, červená/čierna stolica, vykašliavanie krvi, vracanie krvi alebo látky podobnej usadenine z kávy.

- Ak spadnete alebo sa zraníte, najmä ak si udriete hlavu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak pocítite pálenie záhy alebo nevoľnosť, vraciate, pocítite žalúdočné ťažkosti, nadúvanie alebo bolesť v hornej časti brucha, neprestaňte užívať Pradaxu bez konzultácie so svojím lekárom.

Pradaxa Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Pradaxa je perorálne antikoagulancium (priamy inhibítor trombínu).
- Pred chirurgickým alebo iným invazívnym zákrokom môže byť potrebné ukončiť liečbu Pradaxou.
- V prípadoch závažných príhod krvácania sa musí liečba Pradaxou okamžite prerušiť.
- K dispozícii je špecifické antidotum (Praxbind). Pozrite si súhrn charakteristických vlastností lieku Pradaxa a Praxbind.
- Pradaxa sa vylučuje hlavne obličkami. Musí sa udržiavať adekvátne diuréza. Pradaxa môže byť dialyzovaná. 5

Prosím, vyplňte túto časť karty alebo požiadajte o to lekára.
Informácie o pacientovi

Meno pacienta

Dátum narodenia

Indikácia antikoagulačnej liečby

Dávkovanie lieku Pradaxa

POHOTOVOSTNÁ KARTA PACIENTA

Pradaxa®

dabigatranetexilát

- Noste túto kartu neustále pri sebe
- Vždy sa uistite, či máte aktuálnu verziu

02/2018



Boehringer
Ingelheim